

Herger & Germann 2015. Käfer vom östlichen Napfgebiet (Romoos und Umgebung) 680-1250 m ü. M., Kanton Luzern (Coleoptera)

Appendix 1. Artenliste der Käfer vom östlichen Napfgebiet (Romoos und Umgebung) (Coleoptera, ohne Staphylinidae, Curculionioidea und einige kleine, noch unbearbeitete Familien). Die Nomenklatur richtet sich nach der Fauna Europaea (2013). Die Familien und innerhalb der Familien die Gattungen und Arten sind in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Bei jeder Art ist die Anzahl insgesamt und die Anzahl pro Lokalität und pro Fangmethode angegeben.

Abkürzungen: RoÄ = Romoos, Änzihüsli-Oberänzi (1250 m); RoN = Romoos, Neumatt (680 m bzw. 700 m); RoS = Romoos, Schwändi (1030 m); RoU = Romoos, Unter Änzi (1230 m); LF = Lichtfalle; Tf = Tagfänge; ! zCH = Erstmeldung für die Zentralschweiz, ! LU = Erstmeldung für den Kanton Luzern.

Familie (Anzahl Exemplare / Anzahl Arten) Art	Anzahl total	Anzahl / Lokalität				Anz./Fangmeth.		Determinatoren
		RoÄ	RoN	RoS	RoU	LF	Tf	
Anthicidae (6 Ex / 1 Art)								
<i>Omonadus floralis</i> (Linné, 1758)	6	6				6		Herger
Anobiidae (39 Ex / >9 Arten)								
<i>Anobium punctatum</i> (De Geer, 1774)	2	2				2		Herger
<i>Dryophilus pusillus</i> (Gyllenhal, 1808)	8	5				3	8	Herger, Zahradnik
<i>Ernobius abietinus</i> (Gyllenhal, 1808)	15	14				1	15	Herger, Zahradnik
<i>Ernobius abietis</i> (Fabricius, 1792)	2	1				1	2	Zahradnik
<i>Ernobius mollis</i> (Linné, 1758)	3	3					3	Herger, Zahradnik
<i>Hadrobregmus pertinax</i> (Linné, 1758)	1	1					1	Zahradnik
<i>Hemicoelus costatus</i> (Aragon, 1830)	1	1					1	Zahradnik
<i>Ptilinus pectinicornis</i> (Linné, 1758)	3	3					3	Zahradnik
<i>Ptinus sexpunctatus</i> Panzer, 1795	1	1					1	Herger
<i>Ptinus</i> sp.	3	2				1	3	Herger
Aphodiidae (4636 Ex / 8 Arten)								
<i>Acrossus rufipes</i> (Linné, 1758)	4494	3337				1157	4494	Herger, Pittino
<i>Agrilinus convexus</i> (Erichson, 1848)	7	1	2		4	6	1 Herger	
<i>Agrilinus rufus</i> (Moll, 1782)	72	18				54	72	Herger, Pittino
<i>Colobopterus erraticus</i> (Linné, 1758)	2	2					2	Herger
<i>Melinopterus prodromus</i> (Brahm, 1790)	4	4					2	2 Herger
<i>Nialus varians</i> (Duftschmid, 1805)	2	2					1	1 Herger
<i>Nimbus contaminatus</i> (Herbst, 1783)	54	1	1		52	53	1 Herger, Pittino	
<i>Otophorus haemorrhoidalis</i> (Linné, 1758)	1	1					1 Herger	
Buprestidae (7 Ex / 3 Arten)								
<i>Agrilus viridis</i> Linné, 1758	1	1						1 Barbalat
<i>Anthaxia helvetica</i> Stierlin, 1868	3	1			2		3 Barbalat	
<i>Anthaxia quadripunctata</i> (Linné, 1758)	3			1	2	2	1 Barbalat	
Byrrhidae (4 Ex / 1 Art)								
<i>Cytilus sericeus</i> (Forster, 1771)	4	4					1	3 Herger
Byturidae (29 Ex / 1 Art)								
<i>Byturus tomentosus</i> (De Geer, 1774)	29	4	1	23	1	1	28 Herger	
Cantharidae (2834 Ex / 44 Arten)								
<i>Ancistronycha abdominalis</i> (Fabricius, 1798)	2	1				1	2	Herger
<i>Ancistronycha abdominalis - violacea</i> ♀♀	5	1				4	5	Herger
<i>Ancistronycha erichsonii</i> (Bach, 1852)	141	132				9	138	3 Herger
<i>Ancistronycha violacea</i> (Paykull, 1798)	34	1	29		4	29	5 Herger	
<i>Cantharis cryptica</i> Ashe, 1947	6	6					6	Herger
<i>Cantharis cryptica - pallida</i> ♀♀	17	16				1	14	3 Herger
<i>Cantharis decipiens</i> Baudi, 1871	19	19					17	2 Herger
<i>Cantharis fusca</i> Linné, 1758	1	1					1	Herger
<i>Cantharis livida</i> Linné, 1758	38	7	15		16	29	9 Herger	
<i>Cantharis nigricans</i> (Müller, 1766)	90	16	22	4	48	68	22 Herger	
<i>Cantharis obscura</i> Linné, 1758	2	2					2	Herger
<i>Cantharis pallida</i> Goeze, 1777	18	1	12		5	17	1 Herger	
<i>Cantharis paludosa</i> Fallén, 1807	1	1					1	Herger
<i>Cantharis pellucida</i> Fabricius, 1792	53	2	41	3	7	44	9 Herger	
<i>Cantharis rufa</i> Linné, 1758	202	180				22	202	Herger
<i>Cantharis rustica</i> Fallén, 1807	2	1	1				2 Herger	

Familie (Anzahl Exemplare / Anzahl Arten) Art	! Neu für	Anzahl total	Anzahl / Lokalität				Anz./Fangmeth.		Determinatoren
			RoÄ	RoN	RoS	RoU	LF	Tf	
<i>Cantharis terminata</i> Faldermann, 1835		5		1	1	3	4	1	Herger
<i>Cratosilis denticollis</i> (Schummel, 1844)	! LU	21	1	19		1	1	20	Herger
<i>Malthodes caudatus</i> Weise, 1892	! zCH	4		4			4		Herger
<i>Malthodes debilis</i> Kiesenwetter, 1852	! zCH	1		1			1		Herger
<i>Malthodes dispar</i> (Germar, 1824)		28		26	1	1	27	1	Herger, Svihla, Wittmer
<i>Malthodes fibulatus</i> Kiesenwetter, 1852	! zCH	1		1			1		Wittmer
<i>Malthodes fuscus</i> (Waltl, 1838)		2		2			2		Herger
<i>Malthodes hexacanthus</i> Kiesenwetter, 1852		332		284		48	332		Herger, Svihla, Wittmer
<i>Malthodes lucernensis</i> Wittmer, 1981		15		15			15		Herger
<i>Malthodes marginatus</i> (Latreille, 1806)		4		4			4		Herger
<i>Malthodes maurus</i> (Castelnau, 1840)		91		89		2	91		Herger, Svihla
<i>Malthodes minimus</i> (Linné, 1758)	! LU	1		1			1		Wittmer
<i>Malthodes montanus</i> Kiesenwetter, 1863	! zCH	1		1			1		Wittmer
<i>Malthodes mysticus</i> Kiesenwetter, 1852		18		17		1	18		Herger, Wittmer
<i>Malthodes penninus</i> Baudi, 1871	! LU	1				1	1		Svihla
<i>Malthodes spathifer</i> Kiesenwetter, 1852		5		5			5		Herger, Svihla, Wittmer
<i>Malthodes trifurcatus trifurcatus</i> Kiesenwetter, 1852		2				2	2		Herger
<i>Malthodes</i> sp. ♀♀		49		40		9	49		Herger, Svihla, Wittmer
<i>Metacantharis clypeata</i> (Illiger, 1798)	! zCH	1	1						1 Herger
<i>Metacantharis discoidea</i> (Ahrens, 1812)		11		11			11		Herger
<i>Podabrus alpinus</i> (Paykull, 1798)		67	2	35	2	28	62	5	Herger
<i>Podistra prolixa</i> (Märkel, 1851)		2				2	2		Herger
<i>Podistra rufotestacea</i> (Letzner, 1845)		45		37		8	45		Herger
<i>Podistra schoenherri</i> (Dejean, 1837)		9		8		1	9		Herger
<i>Rhagonycha atra</i> (Linné, 1767)		1				1	1		Herger
<i>Rhagonycha fulva</i> (Scopoli, 1763)		984	5	483	11	485	932	52	Herger
<i>Rhagonycha lignosa</i> (Müller, 1764)		337		298		39	336	1	Herger
<i>Rhagonycha lutea</i> (Müller, 1764)		16		16			16		Herger
<i>Rhagonycha nigriventris</i> Motschulsky 1860		28	9	4		15	19	9	Herger
<i>Rhagonycha testacea</i> (Linné, 1758)		1		1			1		Herger
<i>Rhagonycha translucida</i> (Krynitzky, 1832)		119		69	1	49	118	1	Herger
<i>Rhagonycha</i> sp.		1		1			1		Herger
Carabidae (85 Ex / 14 Arten)									
<i>Agonum muelleri</i> (Herbst, 1784)		4	1	2		1	1	3	Herger
<i>Agonum sexpunctatum</i> (Linné, 1758)		2	2					2	Herger
<i>Agonum viduum</i> (Panzer, 1796)		4	2	2				4	Herger
<i>Amara aenea</i> (De Geer, 1774)		5	1	3		1	4	1	Marggi
<i>Amara familiaris</i> (Duftschmid, 1812)		7	1	4		2	4	3	Marggi
<i>Amara lunicollis</i> Schiödte, 1837		2	1	1			1	1	Marggi
<i>Amara ovata</i> (Fabricius, 1792)		1		1			1		Marggi
<i>Amara plebeja</i> (Gyllenhal, 1810)		2		2			1	1	Marggi
<i>Anisodactylus binotatus</i> (Fabricius, 1787)		1	1					1	Herger
<i>Bembidion conforme</i> (Dejean, 1831)		3		3			3		Marggi
<i>Bembidion deletum</i> Audinet-Serville, 1821		1				1	1		Marggi
<i>Bembidion ruficorne</i> Sturm, 1825		1		1			1		Marggi
<i>Bembidion tetracolum</i> Say, 1823		1		1			1		Marggi
<i>Bembidion tibiale</i> (Duftschmid, 1812)		10		10				10	Marggi
<i>Bradycellus harpalinus</i> (Audinet-Serville, 1821)		2		2			2		Herger
<i>Calathus melanocephalus</i> (Linné, 1758)		1				1	1		Herger
<i>Chlaenius vestitus</i> (Paykull, 1790)		2		2			2		Herger
<i>Cicindela campestris campestris</i> Linné, 1758		6	5		1			6	Herger
<i>Cicindela sylvicola</i> Dejean, 1822		3	3					3	Herger
<i>Dromius quadraticollis</i> Morawitz, 1862		1		1			1		Marggi
<i>Limodromus assimilis</i> (Paykull, 1790)		3		3			1	2	Herger
<i>Nebria brevicollis</i> (Fabricius, 1792)		3	1	1	1			3	Herger
<i>Ophonus puncticeps</i> Stephens, 1828		3		3			3		Marggi
<i>Poecilus cupreus</i> (Linné, 1758)		3	1	2			1	2	Herger
<i>Poecilus versicolor</i> (Sturm, 1824)		7	3	3	1		1	6	Herger
<i>Pterostichus melanarius</i> (Illiger, 1798)		2	1			1	1	1	Herger
<i>Pterostichus niger</i> (Schaller, 1783)		1			1			1	Herger
<i>Pterostichus vernalis</i> (Panzer, 1796)		1		1				1	Herger
<i>Stenolophus mixtus</i> (Herbst, 1784)		1		1				1	Herger
<i>Trechus rubens</i> (Fabricius, 1792)	! LU	2		2			2		Marggi
Cerambycidae (170 Ex / 26 Arten)									
<i>Alosterna tabacicolor</i> (De Geer, 1775)		7		4	3			7	Herger
<i>Anastrangalia dubia</i> (Scopoli, 1763)		27	1	19	7			27	Herger

Familie (Anzahl Exemplare / Anzahl Arten) Art	Anzahl total	Anzahl / Lokalität				Anz./Fangmeth.		Determinatoren
		RoÄ	RoN	RoS	RoU	LF	Tf	
<i>Anastrangalia sanguinolenta</i> (Linné, 1761)	2			2				2 Barbalat, Herger
<i>Aromia moschata</i> (Linné, 1758)	1			1			1	Herger
<i>Clytus arietis</i> (Linné, 1758)	1			1				1 Herger
<i>Clytus lama</i> Mulsant, 1847	1			1				1 Herger
<i>Dinoptera collaris</i> (Linné, 1758)	3			3				3 Herger
<i>Gaurotes virginea</i> (Linné, 1758)	7	4	1	2				7 Herger
<i>Grammoptera ruficornis</i> (Fabricius, 1781)	9			9				9 Barbalat, Herger
<i>Leiopus nebulosus</i> (Linné, 1758)	1			1			1	Barbalat
<i>Molorchus minor</i> (Linné, 1758)	8		2	4	2		2	6 Barbalat, Herger
<i>Obrium brunneum</i> (Fabricius, 1792)	5		5				4	1 Barbalat, Herger
<i>Oxymirus cursor</i> Linné, 1758	1		1				1	Herger
<i>Pachytodes cerambyciformis</i> (Schrank, 1781)	25		13	12				25 Herger
<i>Phymatodes testaceus</i> (Linné, 1758)	1		1				1	Barbalat
<i>Phytoecia cylindrica</i> (Linné, 1758)	7			7				7 Herger
<i>Pidonia lurida</i> (Fabricius, 1792)	7		2	5				7 Herger
<i>Pogonocherus hispidus</i> (Linné, 1758)	1		1				1	Barbalat
<i>Rhagium inquisitor</i> (Linné, 1758)	2		2				2	Herger
<i>Rhagium mordax</i> (De Geer, 1775)	3		2	1			2	1 Herger
<i>Rutpela maculata</i> (Poda, 1761)	16		11	5				16 Herger
<i>Saperda carcharias</i> (Linné, 1758)	2		2				2	Herger
<i>Stenostola dubia</i> (Laicharting, 1784)	1		1				1	Barbalat
<i>Stenurella melanura</i> (Linné, 1758)	14	1	2	11				14 Herger
<i>Stictoleptura rubra</i> (Linné, 1758)	11		7	4			2	9 Herger
<i>Tetropium castaneum</i> (Linné, 1758)	7		6		1		7	Barbalat, Herger
Cetoniidae (2 Ex / 2 Arten)								
<i>Gnorimus nobilis</i> (Linné, 1758)	1		1					1 Herger
<i>Trichius fasciatus</i> (Linné, 1758)	1		1					1 Herger
Chrysomelidae (186 Ex / >35 Arten)								
<i>Agelastica alni</i> (Linné, 1758)	1		1					1 Herger
<i>Altica</i> sp.	2		1	1				2 Herger
<i>Cassida rubiginosa</i> Müller, 1776	3		2	1				3 Sekerka
<i>Cassida viridis</i> Linné, 1758	3	3						3 Kamke, Sekerka
<i>Chaetocnema hortensis</i> (Fourcroy, 1785)	1		1				1	Herger
<i>Chrysolina cerealis cerealis</i> (Linné, 1767) ! zCH	1	1						1 Sprecher
<i>Chrysolina coeruleans</i> (Scriba, 1791)	7	5		2				7 Sprecher
<i>Chrysolina fastuosa</i> (Scopoli, 1763)	3	2	1					3 Herger
<i>Chrysolina polita</i> (Linné, 1758)	5	5						5 Herger, Kamke
<i>Clytra quadripunctata quadripunctata</i> (Linné, 1758)	5	4		1				5 Herger
<i>Cryptocephalus aureolus</i> Suffrian, 1847	3	2	1				1	2 Herger
<i>Cryptocephalus hypochaeridis</i> <i>hypochaeridis</i> (Linné, 1758)	4	1	2	1				4 Herger
<i>Cryptocephalus sericeus</i> (Linné, 1758)	2	2						2 Herger
<i>Cryptocephalus vittatus</i> Fabricius, 1775	2	2						2 Herger
<i>Galerucella tenella</i> (Linné, 1761)	2		2					2 Herger
<i>Gastrophysa viridula</i> (De Geer, 1775)	37	10	21	4	2		3	34 Herger, Kamke
<i>Gonioctena viminalis</i> (Linné, 1758)	2		2					2 Herger
<i>Hydrothassa glabra</i> (Herbst, 1783)	4	3	1					4 Herger, Kamke
<i>Lochmaea caprea</i> (Linné, 1758)	2		2					2 Herger
<i>Longitarsus holsaticus</i> (Linné, 1758)	1				1		1	Doeberl
<i>Longitarsus luridus</i> (Scopoli, 1763)	2				2		2	Doeberl
<i>Longitarsus melanocephalus</i> (De Geer, 1775)	1		1				1	Herger
<i>Longitarsus pratensis</i> (Panzer, 1794)	1		1				1	Doeberl
<i>Longitarsus succineus</i> (Foudras, 1860)	2				2		2	Doeberl
<i>Longitarsus</i> sp.	1				1		1	Herger
<i>Luperus flavipes</i> (Linné, 1767)	40		40				40	Herger, Kamke
<i>Luperus longicornis</i> (Fabricius, 1781)	1		1				1	Kamke
<i>Luperus</i> sp. (<i>luperus</i> - <i>flavipes</i>) ♀♀	13		13				13	Herger, Kamke
<i>Neocrepidodera ferruginea</i> (Scopoli, 1763)	2				2		2	Doeberl
<i>Oreina alpestris</i> (Schummel, 1843)	1	1						1 Sprecher
<i>Oreina cacaliae</i> (Schrank, 1785)	2	2						2 Sprecher
<i>Oreina speciosa</i> (Linné, 1767)	2	1	1					2 Sprecher
<i>Oreina speciosissima</i> (Scopoli, 1763)	9	8	1					9 Sprecher
<i>Oulema erichsonii</i> (Suffrian, 1841)	1		1					1 Herger
<i>Phratora vitellinae</i> (Linné, 1758)	4		4					4 Herger
<i>Phratora vulgatissima</i> (Linné, 1758)	4		2	2				4 Herger
<i>Phyllotreta striolata</i> (Fabricius, 1803)	3		3				3	Herger

Familie (Anzahl Exemplare / Anzahl Arten) Art	Anzahl total	Anzahl / Lokalität				Anz./Fangmeth.		Determinatoren
		RoÄ	RoN	RoS	RoU	LF	Tf	
<i>Plagiosterna aenea</i> (Linné, 1758)	3	2	1					3 Herger, Kamke
<i>Plateumaris consimilis</i> (Schränk, 1781)	2	2						2 Herger
<i>Smaragdina salicina</i> (Scopoli, 1763)	2		2					2 Herger
Ciidae (7 Ex / 3 Arten)								
<i>Cis boleti</i> (Scopoli, 1763)	1		1			1		Graf
<i>Cis villosulus</i> Mellié, 1848	3		3			3		Graf
<i>Cis</i> sp.	1		1			1		Graf
<i>Ennearthron cornutum</i> (Gyllenhal, 1827)	2		2			2		Graf
Cleridae (12 Ex / 2 Arten)								
<i>Korynetes caeruleus</i> (De Geer, 1775)	8		8			8		Besuchet, Herger
<i>Trichodes apiarius</i> (Linné, 1758)	4		2	2			4	Besuchet, Herger
Coccinellidae (127 Ex / 7 Arten)								
<i>Anatis ocellata</i> (Linné, 1758)	2		1		1	2		Rintelen
<i>Aphidecta oblitterata</i> (Linné, 1758)	1				1	1		Rintelen
<i>Calvia decemguttata</i> (Linné, 1767)	21		21			21		Herger, Rintelen
<i>Coccinella septempunctata</i> Linné, 1758	4	1			3	1	3	Herger, Rintelen
<i>Halyzia sedecimguttata</i> (Linné, 1758)	97		15		82	97		Herger, Rintelen
<i>Propylea quatuordecimpunctata</i> (Linné, 1758)	1		1			1		Herger
<i>Scymnus haemorrhoidalis</i> Herbst, 1797	1		1			1		Herger
Cryptophagidae (279 Ex / >3 Arten)								
<i>Ephistemus globulus</i> (Paykull, 1798)	1		1			1		Herger
<i>Telmatophilus caricis</i> (Olivier, 1790)	1		1			1		Herger
noch unbearbeitetes Material	277		251		26	277		
Dascillidae (4 Ex / 1 Art)								
<i>Dascillus cervinus</i> (Linné, 1758)	4	3			1	1	3	Herger
Dasytidae (21 Ex / 2 Arten)								
<i>Dasytes cyaneus</i> (Fabricius, 1775)	1		1			1		Majer
<i>Dasytes plumbeus</i> (Müller, 1776)	20		15	5		6	14	Herger, Majer
Dermestidae (15 Ex / 7 Arten)								
<i>Anthrenus museorum</i> (Linné, 1761)	3		1	1	1	2	1	Besuchet
<i>Anthrenus pimpinellae</i> Fabricius, 1775	1		1			1		Besuchet
<i>Anthrenus verbasci</i> (Linné, 1767)	1		1			1		Besuchet
<i>Attagenus pellio</i> (Linné, 1758)	1		1			1		Herger
<i>Attagenus punctatus</i> (Scopoli, 1772)	4		4			4		Besuchet, Herger
<i>Megatoma undata</i> (Linné, 1758)	4		4			4		Besuchet, Herger
<i>Trogoderma glabrum</i> (Herbst, 1797)	1		1			1		Herger
Dytiscidae (13 Ex / 1 Art)								
<i>Ilybius fuliginosus</i> (Fabricius, 1792)	13		13			13		Brancucchi, Herger
Elateridae (166 Ex / 18 Arten)								
<i>Adrastus limbatus</i> (Fabricius, 1776)	1		1			1		Platia
<i>Adrastus pallens</i> (Fabricius, 1792)	1		1			1		Platia
<i>Agriotes obscurus</i> (Linné, 1758)	5		4		1	4	1	Chittaro
<i>Agrypnus murinus</i> (Linné, 1758)	1		1			1		Chittaro
<i>Anostirus purpureus</i> (Poda, 1761)	1		1			1		Chittaro
<i>Aplotarsus incanus</i> (Gyllenhal, 1827)	4		4			4		Chittaro
<i>Athous haemorrhoidalis</i> (Fabricius, 1801)	3		3			3		Chittaro
<i>Athous subfuscus subfuscus</i> (Müller, 1767)	16	3		11	2	2	14	Chittaro
<i>Athous vittatus</i> (Gmelin, 1790)	5	3	2				5	Chittaro
<i>Ctenicera cuprea</i> (Fabricius, 1775)	31	31					31	Chittaro
<i>Ctenicera pectinicornis</i> (Linné, 1758)	2		2				2	Chittaro
<i>Dalopius marginatus</i> (Linné, 1758)	20		15		5	19	1	Chittaro
<i>Denticollis linearis</i> (Linné, 1758)	23		23			23		Chittaro
<i>Hemicrepidius niger</i> (Linné, 1758)	23	3	18	2		23		Chittaro
<i>Limonius minutus</i> (Linné, 1758)	1		1			1		Chittaro
<i>Melanotus castanipes</i> (Paykull, 1800)	26		22		4	26		Chittaro
<i>Pheletes quercus</i> (Olivier, 1790)	2		2			2		Chittaro
<i>Zorochros demustoides</i> (Herbst 1806)	1		1			1		Platia

Familie (Anzahl Exemplare / Anzahl Arten) Art	Anzahl total	Anzahl / Lokalität				Anz./Fangmeth.		Determinatoren
		RoÄ	RoN	RoS	RoU	LF	Tf	
Eucnemidae (2 Ex / 1 Art)								
<i>Hylis cariniceps</i> Reitter, 1902	2		2			2		Chittaro
Geotrupidae (6 Ex / 2 Arten)								
<i>Anoplotrupes stercorosus</i> (Scriba, 1791)	2	1		1			2	Herger
<i>Geotrupes stercorarius</i> (Linné, 1758)	4				4	4		Herger
Hydrophilidae (2578 Ex / 16 Arten)								
<i>Cercyon analis</i> (Paykull, 1798)	8		8			8		Herger
<i>Cercyon atricapillus</i> (Marsham, 1802)	19		18		1	19		Herger
<i>Cercyon impressus</i> (Sturm, 1807)	5	1	4			4	1	Herger
<i>Cercyon laminatus</i> Sharp, 1873	146		143		3	146		Herger
<i>Cercyon lateralis</i> (Marsham, 1802)	66		66			66		Herger
<i>Cercyon melanocephalus</i> (Linné, 1758)	6		6			6		Herger
<i>Cercyon pygmaeus</i> (Illiger, 1801)	3		3			3		Herger
<i>Cercyon quisquilius</i> (Linné, 1761)	188		159		29	188		Herger
<i>Cercyon unipunctatus</i> (Linné, 1758)	2040		1745		295	2040		Herger
<i>Cryptopleurum subtile</i> Sharp, 1884	12		11		1	12		Herger
<i>Helophorus brevipalpis</i> Bedel, 1881	40		40			40		Herger
<i>Helophorus</i> sp.	2		2			2		Herger
<i>Hydrobius fuscipes</i> (Linné, 1758)	6		6			6		Herger
<i>Sphaeridium marginatum</i> Fabricius, 1787	9	! LU	8	1		8	1	Esser
<i>Sphaeridium lunatum</i> Fabricius, 1792	11		11			5	6	Herger
<i>Sphaeridium scarabaeoides</i> (Linné, 1758)	17		12	5		4	13	Herger
Kateretidae (1 Ex / 1 Art)								
<i>Brachypterus urticae</i> (Fabricius, 1792)	1				1		1	Herger
Latridiidae (13 Ex / ? Arten)								
noch unbearbeitet	13		13			13		
Leiodidae (4 Ex / 4 Arten)								
<i>Anisotoma humeralis</i> (Fabricius, 1792)	1	! zCH	1			1		Herger
<i>Choleva agilis</i> (Illiger, 1798)	1	! zCH	1			1		Herger
<i>Colon brunneum</i> (Latreille, 1807)	1	! LU	1			1		Herger
<i>Leiodes politus</i> (Marsham, 1802)	1		1			1		Herger
Lymexylonidae (5 Ex / 1 Art)								
<i>Hylecoetus dermestoides</i> (Linné, 1761)	5		3	2		3	2	Besuchet, Herger
Lucanidae (1 Ex / 1 Art)								
<i>Platycerus caprea</i> (De Geer, 1774)	1		1			1		Zilioli
Malachiidae (20 Ex / 3 Arten)								
<i>Anthocomus fasciatus</i> (Linné, 1758)	15		15			15		Herger, Svihla
<i>Malachius aeneus</i> (Linné, 1758)	4		1	3			4	Herger
<i>Troglops albicans</i> (Linné, 1767)	1	! LU	1			1		Herger
Melandryidae (1 Ex / 1 Art)								
<i>Serropalpus barbatus</i> (Schaller, 1783)	1		1			1		Herger
Melolonthidae (141 Ex / 2 Arten)								
<i>Melolontha melolontha</i> (Linné, 1758)	59		57		2	59		Herger
<i>Serica brunnea</i> (Linné, 1758)	82		37		45	82		Herger
Monotomidae (117 Ex / 3 Arten)								
<i>Monotoma picipes</i> Herbst, 1793	115		114		1	115		Herger
<i>Rhizophagus depressus</i> (Fabricius, 1792)	1	! zCH	1			1		Herger
<i>Rhizophagus nitidulus</i> (Fabricius, 1798)	1		1			1		Herger
Mordellidae (22 Ex / > 1 Art)								
<i>Tomoxia bucephala</i> (Costa, 1854)	3		3			3		Horak
noch unbearbeitetes Material	19		18	1		3	16	
Mycetophagidae (30 Ex / 3 Arten)								
<i>Litargus connexus</i> (Fourcroy, 1785)	5		5			5		Herger
<i>Mycetophagus atomarius</i> (Fabricius, 1792)	1	! zCH	1			1		Besuchet
<i>Typhaea stercorea</i> (Linné, 1758)	24		17		7	24		Herger

Familie (Anzahl Exemplare / Anzahl Arten) Art	Anzahl total	Anzahl / Lokalität				Anz./Fangmeth.		Determinatoren
		RoÄ	RoN	RoS	RoU	LF	Tf	
Nitidulidae (12 Ex / > 8 Arten)								
<i>Brassicogethes viridescens</i> (Fabricius, 1787) ! LU	2		2			2		Jelinek
<i>Cycharmus luteus</i> (Fabricius, 1787)	1		1				1	Herger
<i>Eपुरaea melanocephala</i> (Marshall, 1802)	1		1			1		Jelinek
<i>Eपुरaea melina</i> Erichson, 1843 ! zCH	1		1			1		Jelinek
<i>Eपुरaea</i> sp.	3		3			3		Herger
<i>Glischrochilus quadriguttatus</i> (Fabricius, 1776)	1		1			1		Herger
<i>Meligethes</i> sp. (i.w.S.)	2		1		1		2	Herger
<i>Omosita depressa</i> (Linné, 1758)	1		1				1	Herger
Oedemeridae (47 Ex / 8 Arten)								
<i>Anogcodes rufiventris</i> (Scopoli, 1763)	4		4				4	Herger
<i>Calopus serraticornis</i> (Linné, 1758) ! LU	4					4		Besuchet
<i>Nacerdes carniolica</i> (Gistel, 1832)	2		2			2		Herger
<i>Oedemera femorata</i> (Scopoli, 1763)	2		2				2	Herger
<i>Oedemera lurida</i> (Marshall, 1802)	2	1			1		2	Herger
<i>Oedemera subulata</i> Olivier, 1794	1				1		1	Herger
<i>Oedemera tristis</i> Schmidt, 1846	30	4	19		7		30	Herger
<i>Oedemera virescens</i> (Linné, 1767)	2	1	1				2	Herger
Ptiliidae (8 Ex / ? Arten)								
noch unbearbeitet	8		8				8	
Pyrochroidae (9 Ex / 2 Arten)								
<i>Pyrochroa coccinea</i> (Linné, 1761)	2		2			2		Herger
<i>Pyrochroa serraticornis</i> (Scopoli, 1763)	7		7			4	3	Herger
Rutelidae (27 Ex / 3 Arten)								
<i>Hoplia argentea</i> (Poda, 1761)	12	9	1		2	1	11	Herger
<i>Hoplia philanthus</i> (Fuesslin, 1775)	8	5	3				8	Herger
<i>Phyllopertha horticola</i> (Linné, 1758)	7	2	2		3		7	Herger
Salpingidae (2 Ex / 1 Art)								
<i>Salpingus ruficollis</i> (Linné, 1761) ! zCH	2		2			2		Herger
Scarabaeidae (2 Ex / 2 Arten)								
<i>Onthophagus coenobita</i> (Herbst, 1783)	1		1				1	Herger
<i>Onthophagus ovatus</i> (Linné, 1767)	1		1				1	Herger
Scirtidae (7 Ex / 3 Arten)								
<i>Cyphon coarctatus</i> Paykull, 1799	3		3			2	1	Herger
<i>Cyphon ruficeps</i> Tournier, 1868	2		2			2		Herger
<i>Elodes pseudominuta</i> Klausnitzer, 1971	2		2			2		Herger
Scraptiidae (18 Ex / >2 Arten)								
<i>Anaspis costai</i> Emery, 1876 ! LU	1		1			1		Horak
<i>Anaspis rufilabris</i> (Gyllenhal, 1827)	1		1			1		Horak
noch unbestimmtes Material	16		12		4	7	9	
Silphidae (180 Ex / 6 Arten)								
<i>Necrodes littoralis</i> (Linné, 1758)	8		3		5	8		Herger
<i>Nicrophorus humator</i> (Gleditsch, 1767)	47		44		3	47		Herger
<i>Nicrophorus investigator</i> Zetterstedt, 1824	120		59		61	120		Herger
<i>Nicrophorus vespillo</i> (Linné, 1758)	3		3			3		Herger
<i>Nicrophorus vespilloides</i> Herbst, 1783	1				1		1	Herger
<i>Thanatophilus sinuatus</i> (Fabricius, 1775)	1		1			1		Herger
Tenebrionidae (6 Ex / 2 Arten)								
<i>Lagria hirta</i> (Linné, 1758)	4		2		2	4		Herger
<i>Tenebrio molitor</i> Linné, 1758	2		2			2		Besuchet
Throscidae (1 Ex / 1 Art)								
<i>Trixagus dermestoides</i> (Linné, 1767)	1		1			1		Herger
Trogositidae (1 Ex / 1 Art)								
<i>Tenebroides fuscus</i> (Goeze, 1777)	1				1	1		Besuchet
Total Exemplare	11903	222	8804	175	2702	11180	723	
Total Arten	> 268	67	249	51	80	213	139	